

## اطلاعیه

### قابل توجه باغداران عزیز

### بیماری لکه غربالی درختان میوه هسته دار:

این بیماری بر روی همه نوع درختان هسته دار (هلو، شلیل، گیلان، بادام، زردآلو، آلو) قابل مشاهده است خسارت عمده بیماری روی درختان زرد آلو هست. عامل

بیماری قارچی است به نام *Stigmina carpophila*.

### علائم بیماری:

این بیماری غالباً به برگ، میوه و سرشاخه های درختان میوه هسته دار حمله میکند بر روی برگ لکه های نکروتیک ارغوانی به قطر ۳ تا ۱۰ میلیمتر به وجود می آید که تدریجاً از پهنک برگ جدا شده و برگ حالت غربالی به خود می گیرد. علائم روی میوه زردآلو بصورت تاولهای برجسته ارغوانی رنگ می باشد. بر روی میوه بادام علائم خاصی مشاهده نمیشود و فقط ترشح صمغ دیده میشود اما روی سرشاخه ها لکه های گرد و کشیده قابل مشاهده است.

### کنترل و پیشگیری:

جهت کنترل و پیشگیری از این بیماری لازم است باغداران به نکات ذیل توجه داشته باشند:

- هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آنها موجب کاهش آلودگی در سال بعد میشود.
- بهترین راه کنترل استفاده از قارچکشها می باشد برای این منظور می توان از یکی از سموم کاپتان و یا اکسی کلرور مس استفاده نمود سمپاشی باید در پاییز بعد از ریزش برگها در اواخر زمستان قبل از باز شدن جوانه ها و در اوایل بهار انجام شود.

